



Fiche technique n.2

LA SÉDATION PRÉ-EUTHANASIQUE

OBJECTIF DE LA FICHE :

Accompagner les équipes vétérinaires à mieux maîtriser la **sédation** pré-euthanasique. Une méthode **fiable et adaptée** qui offre aux animaux une fin de vie paisible tout en assurant un **soutien** respectueux aux familles.



AVANTAGES DE LA SÉDATION

- Pratique intégrée dans une **démarche qualité**.
- **Réduction stress & douleur** pour l'animal.
- Pose de la **voie veineuse sans contention** après la sédation.
- **Mort « paisible »** avec **réduction** des **signes cliniques** de la mort.
- **Temps** pour le « **au revoir** » des familles.



s o l â m e

PROPOSITION DE PROTOCOLES

1 CHIENS

Voie intramusculaire ou sous-cutanée (dans la même seringue) :

Après +/- 5 min

Poids du chien (kg)	Medetomidine (ml)	Acépromazine (ml)	Butorphanol (ml)	Ketamine (ml)
	Zenalpha 0,5 mg/ml	Calmivet 5 mg/ml	Torbugesic 10 mg/ml	Clorketam 100 mg/ml
2	0,06	0,10	0,02	0,05
3	0,08	0,14	0,03	0,07
4	0,10	0,16	0,04	0,08
5	0,14	0,20	0,05	0,10
6	0,16	0,25	0,06	0,13
7	0,17	0,30	0,07	0,15
8	0,18	0,35	0,08	0,18
9	0,20	0,40	0,09	0,20
10	0,25	0,50	0,10	0,25
15	0,30	0,60	0,15	0,30
20	0,40	0,90	0,20	0,45
25	0,45	1,10	0,30	0,55
30	0,50	1,30	0,35	0,65
35	0,60	1,60	0,40	0,80
40	0,70	1,80	0,45	0,90
45	0,80	2,00	0,50	1,00
50	0,90	2,20	0,55	1,10
55	1,10	2,40	0,60	1,20
60	1,20	2,60	0,65	1,30
65	1,30	2,80	0,70	1,40
70	1,40	3,00	0,75	1,50

Au besoin

Prémédication (à la maison / 2h avant) : Gabapentine 60 mg/kg per os

ou Dexmedetomidine gel (Sileo) per os



Protocole adapté de : Dr Cooney (CAETA / AAHA), Lap of Love, Euthabag



2 CHATS

Voie intramusculaire ou sous-cutanée (dans la même seringue) :

Poids du chat	Après +/- 5 min		
	Dexmédétomidine (ml)	Butorphanol (ml)	Ketamine (ml)
	Sedadex 0,5 mg/ml	Torbugesic 10 mg/ml	Clorketam 100 mg/ml
par kg	0,10	0,10	0,10

Si animal non réactif, affaibli (supportant directement la douleur de la kétamine) :

Voie intramusculaire ou sous-cutanée (dans la même seringue) :

Poids du chat	Acépromazine (ml)	Ketamine (ml)
		Calmivet 5 mg/ml
par kg	0,15	0,10



Au besoin

Prémédication (à la maison / 2h avant) : Gabapentine 100-150 mg / CT per os

Protocole adapté de : Lap of Love, Euthabag

3 LAPINS ET AUTRES NACS



Voie intramusculaire (dans la même seringue) :

Dexmédétomidine (ml)	Acépromazine (ml)	Butorphanol (ml)
Sedadex 0,5 mg/ml	Calmivet 5 mg/ml	Torbugesic 10 mg/ml
0,10	0,10	0,10

Répéter les doses si besoin

Au besoin

Prémédication (à la maison / 2h avant) :
Gabapentine 25 mg/kg per os

Protocole adapté de : CAETA, Euthabag



DOSES À ADAPTER
EN FONCTION
DE L'ÉTAT DE L'ANIMAL



NE **JAMAIS** UTILISER CES
DOSES **EN DEHORS** D'UNE
CONSULTATION D'EUTHANASIE

LE MEILLEUR
PROTOCOLE EST
CELUI AVEC
LEQUEL ON EST À
L'AISE